





	Tymai	Raudonukė	Skarlatina	Vėjaraupiai
				
	<b>TYMAI</b>	<b>RAUDONUKĖ</b>	<b>SKARLATINA</b>	<b>VĖJARAUPIAI</b>
<b>Kaip užsikrečiama</b>	Oro lašeliniu būdu.	Oro lašeliniu būdu.	Oro lašeliniu būdu.	Liečiant sergantį ar būnant šalia ir per placenta.
<b>Simptomai</b>	Liga prasideda karščiavimu, kosuliu, sloga, akių junginių uždegimu. Po 1–2 dienų nuo ligos pradžios išberia, pirmiausia – galvos srityje, vėliau bėrimas leidžiasi žemyn, apima liemenį, galūnes.	2–3 dienas karščiuojama, atsiranda bėrimas, kuris trunka nuo kelių valandų iki 2–3 dienų.	Prasideda staigiu karščiavimu (iki 40°C), pasireiškia angina ir tipiškais bėrimais odoje, gerklės, galvos skausmu, pykinimu, kartais vėmimu, apetito stoka, bendru negalavimu. Liežuvis atrodo kaip balta braškė.	Pirmieji simptomai pasireiškia praėjus 2–3 savaitėms nuo užsikrėtimo. Ligos pradžia ūmi. Iš pradžių karščiavimas, silpnumas, bloga savijauta. Vėliau, pradeda berti dėmelėmis, kurios virsta pūslelėmis, pripildytomis skaidraus skysčio.
<b>Kas serga</b>	Imlūs yra ir vaikai, ir suaugusieji.	Imlūs yra ir vaikai, ir suaugusieji.	2–8 metų vaikai.	Imlūs yra ir vaikai, ir suaugusieji.
<b>Gydymas</b>	Taikomas simptominis gydymas.	Esant reikalui taikomas simptominis gydymas.	Esant reikalui taikomas simptominis gydymas. Antibiotikai mažina užkrečiamumo laiką.	Higiena, gulimas režimas, skysčių pusiausvyros atkūrimas. Jokiu būdu negalima kasytis bėrimų.
<b>Užkrečiamumas</b>	Iki 90–95 proc. imlių, imuniteto neturinčių asmenų, kontaktavusių su sergančiuoju tymais, susergera.	Iki 10 dienų prieš atsirandant bėrimams ir kelias dienas išberus.	Negydomas pacientas, sergantis skarlatina, kitus gali užkrėsti 2–3 sav. Jei vartojami antibiotikai, užkrečiamasis laikotarpis sumažėja iki 24 val.	Sergantis vėjaraupiais žmogus gali platinti ligą prieš 1–2 d. iki atsirandant bėrimams ir tęstis iki tol, kol bėrimai virsta šašeliais.
<b>Kaip apsisaugoti</b>	Turi būti įskiepytos bent 2 vakcinos dozės.	Vakcina.	Laikytis higienos.	Vakcina.
<b>Kada įgyjamas imunitetas</b>	Po 2 vakcinos dozių ir persirgus.	Po vakcinos ir po ligos imunitetas įgyjamas visam gyvenimui.	Persirgus įgyjamas imunitetas, tačiau galima susirgti ir kartotinai.	Persirgus susidaro patvarus, ilgalaikis imunitetas.
<b>Komplikacijos</b>	Sergant tymais, dažnai dar prisideda viruso sukeltas plaučių uždegimas, gerklų pakenkimas, rečiau – smegenų uždegimas. Dažniausios tymų komplikacijos – pneumonijos, laringitai, otitai. Retais atvejais gali komplikuotis encefalitu.	Susirgus nėštumo pradžioje, dažnai įvyksta persileidimai. Yra didesnė nei 80 proc. tikimybė, kad moterų, susirgus per pirmąjį nėštumo trimestrą, kūdikiai gims su sunkiais širdies, smegenų apsigimimais, bus akli ar kurti.	Gali sukelti širdies, inkstų, plaučių, ausų, kaulų ir kitų organų pažeidimus.	Grėsmingų komplikacijų išsivystymo rizika suaugusiesiems, sergantiems vėjaraupiais, yra daug kartų didesnė nei vaikams. Susirgus nėštumo metu, galimi pakenkimai kūdikiui, persileidimai.